

Eye 愛 (あいあい) とは福本眼科と福本コンタクトの共同広報誌です
目に関する最新情報をいち早くお届けします♪



今回のテーマ 糖尿病網膜症について

- ・糖尿病そのものに最も相関し、2 型糖尿病では、診断時に 20%は網膜症が存在します。
- ・発症後 20 年で、1 型の 100%、2 型の 60%の患者に網膜症が発症します。
- ・日本では中途失明の原因としては最多でしたが、平成 18 年に緑内障に次いで二位となりました。


● 症状

初期の頃は無症状で経過することが多く、徐々に眼底出血や黄斑浮腫が生じ視力低下、変視症が出てきます。硝子体出血や広範囲な眼底出血を伴うと飛蚊症や急激な視力低下を示します。

● 原因

目の一番奥、眼底には網膜という神経の膜があり、多くの毛細血管があります。糖尿病の患者さんの血液は糖が多く、固まりやすい状態になっているため、網膜の毛細血管を詰まらせたり、血管の壁に負担をかけて眼底出血を起こすことがあります。そして、進行した場合には、硝子体で大出血が起こり、失明に至る場合もあります。眼の合併症には糖尿病網膜症の他にも失明につながる白内障、血管新生緑内障、屈折調節異常などがあります。

出血



単純糖尿病網膜症

糖尿病網膜症で失明しないためには

- ①血糖コントロールを続けましょう
- ②糖尿病と言われたら、必ず眼科で定期的に検査を受けてください
- ③眼科で行った検査結果は、糖尿病眼手帳などに記録してもらいましょう

● 治療

※血糖コントロール

単純網膜症では血糖コントロールによって、眼底出血が改善することもあります。また、他の治療の効果を十分なものにするためにも、血糖コントロールが不可欠です。





お知らせ

インターネットでコンタクトレンズの

お取り置き予約ができます！！

これまでに福本コンタクトでご購入いただいたコンタクトレンズなら、下記のURL（またはQRコード）からお取り置きのご予約ができます！

- 前回の見え方で問題ない。
- コンタクトレンズが毎回注文になる。
- 来店日に確実にコンタクトレンズを受け取りたい。という方におススメ！お気軽にご利用ください♪



福本コンタクトのホームページからご予約できます！

福本コンタクト 検索



↑携帯の方はQRコードでアクセス！

※コンタクトレンズをご購入の際には必ず処方箋が必要です。コンタクトレンズは医療器具です。3カ月に一度は眼科受診しましょう。

診療時間

毎週火曜・金曜日は手術のため、

午前の診療は12:30まで

午後の診療は15:30からになります

※手術により診療開始時間が遅れる場合があります



レーシック無料説明会

当院では、LASIK をよりご理解いただくために随時説明会を開催しております。ご希望の方は、医師またはスタッフまでお気軽にお問い合わせください。

日時：第2土曜日 14時より（要予約）

レーシック説明会ご予約電話番号
088-602-2000



〒770-8054

徳島市山城町西 4-7-2

TEL. 088-602-2000

FAX. 088-602-2224

ホームページ

<http://www.fukumotoganka.jp/>

休診日 日曜・祝日



■診療時間

午前 9:00~13:00

午後 14:00~18:00

※火・金曜は手術のため午後は15:30~

■毎週木曜日 午前のみ

眼科専門医 中平 朋子 先生の診療となります。

■交通アクセス

【最寄駅】JR 高徳線 徳島駅

【最寄駅からの交通手段】

徳島市営バス 9番または22番

山城町(ふれあい健康館)行 約15分

「沖浜東三 バス停」下車 西へ徒歩約3分

